

TRATAMIENTO COMBINADO DE REEMPLAZO DE NICOTINA

PARCHE DE NICOTINA DE 7 MG, 14 MG, 21 MG

Use todos los días

¿QUÉ HACE ESTO?

El parche emite cantidades pequeñas pero continuas de nicotina en el cuerpo a través de la piel para ayudar a disminuir los síntomas de abstinencia.

¿CÓMO LO USO?

- Comience a usar el parche en la fecha en que va a dejar el tabaco.
- Cada día, quítese el parche viejo cuando se despierte, y colóquese un parche nuevo.
- Retire la parte posterior del parche y colóquese en la parte superior del brazo, pecho o espalda sobre piel limpia, seca y sin vello.
- Presione el parche firmemente en su lugar durante 10 segundos para que se adhiera bien a su piel. Si es necesario, puede colocar cinta adhesiva médica sobre el parche para mantenerlo en su lugar.
- Puede bañarse, ducharse y nadar mientras usa el parche.
- Evite usar el parche en el mismo lugar más de una vez por semana.
- Doble el parche usado por la mitad con los lados adhesivos juntos y arrójelo en un contenedor de basura regular, lejos de niños o mascotas.
- Si tiene un desliz y usa tabaco, continúe usando el parche y trate de no fumar o chupar tabaco.
- Si comienza con parches de 21 mg, puede usar el parche durante uno o dos meses. Cuando esté listo, disminuya la dosis y continúe reduciéndola con el tiempo. Por lo general, disminuir su uso toma entre tres y cuatro meses, pero a veces puede tomar más tiempo. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus metas para disminuir su uso.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

- Puede causar ardor leve, picazón o enrojecimiento de la piel. Para reducir este problema, evite usar el parche en el mismo lugar en una semana.
- Si tiene irritación en la piel por más de cuatro días o si tiene ardor severo o urticaria, quítese el parche y deje de usarlo. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato.
- Puede tener problemas para dormir o sueños vívidos. Si es así, quítese el parche antes de acostarse a dormir.

CHICLE DE NICOTINA DE 2 MG, 4 MG

Use cuando lo necesite

¿QUÉ HACE ESTO?

El chicle emite nicotina para ayudar a disminuir los síntomas de abstinencia y se puede usar para antojos fuertes cuando sea necesario.

¿CÓMO LO USO?

- Comience a usar el chicle en la fecha en que va a dejar el tabaco.
- A diferencia del chicle común, mastique despacio unas cuantas veces hasta sentir un hormigueo leve en su boca.
- Coloque el chicle entre su mejilla y encía. Déjelo allí durante un minuto para que absorba la nicotina.
- Repita los pasos de masticar y déjelo entre su mejilla y encía hasta que el sabor u hormigueo desaparezca. Un pedazo de chicle dura entre 20 y 30 minutos.
- No mastique el chicle muy rápido ni trague la nicotina. Puede causarle náuseas o malestar estomacal.
- Evite comer y beber algo ácido por 15 minutos antes de usar el chicle o durante su uso. Los alimentos y bebidas ácidas, como refrescos y café, pueden impedir que el chicle actúe.
- Úselo durante el día. Durante la primera semana, mastique un chicle cada 1 o 2 horas. Use por lo menos 8 a 9 chicles por día para comenzar.
- No mastique más de 24 chicles por día.
- Cada semana, auto evalúese y disminuya gradualmente su uso del chicle durante tres a cuatro meses, o más tiempo si es necesario. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus metas para disminuir su uso.
- Puede usar chicle sin azúcar o dulces sin azúcar para reemplazar el chicle de nicotina.
- Siempre tenga chicle consigo.
- Si tiene un desliz y usa tabaco, continúe usando el chicle y trate de no fumar o chupar tabaco.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

- Puede causar dolor en la boca, irritación oral, hipo, dolores de mandíbula, náuseas y vómito. El uso correcto del chicle puede ayudar a evitar estos efectos secundarios.
- Si no puede tolerar los efectos secundarios, deje de usar el chicle y llame a su proveedor de atención médica.

¡Utilice estas herramientas para apoyo adicional!



Inscríbese en el programa de mensajes de texto de SmokefreeVET

Envíe un mensaje de texto con la palabra **VETesp** al **47848** o vaya a [Smokefree.gov/VETesp](https://www.smokefree.gov/VETesp).



Llame a la línea de ayuda para dejar el tabaco

Hable con un consejero de veteranos para dejar de usar tabaco. Llame al **1-855-QUIT-VET** (1-855-784-8838) de lunes a viernes.

El uso de medicamentos junto con la consejería conductual le da la mejor posibilidad para dejar de usar tabaco. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuál es el mejor medicamento para usted.

LA ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE VETERANOS
veterans.smokefree.gov/recursos-en-espanol

VA



U.S. Department
of Veterans Affairs

 **smokefreeVET**
en Español

1-855-Quit-Vet
TOBACCO QUITLINE