

TRATAMIENTO COMBINADO DE REEMPLAZO DE NICOTINA

PARCHE DE NICOTINA DE 7 MG, 14 MG, 21 MG

Use todos los días

¿QUÉ HACE ESTO?

El parche emite cantidades pequeñas pero continuas de nicotina en el cuerpo a través de la piel para ayudar a disminuir los síntomas de abstinencia.

¿CÓMO LO USO?

- Comience a usar el parche en la fecha en que va a dejar el tabaco.
- Cada día, quítese el parche viejo cuando se despierte, y colóquese un parche nuevo.
- Retire la parte posterior del parche y colóquese en la parte superior del brazo, pecho o espalda sobre piel limpia, seca y sin vello.
- Presione el parche firmemente en su lugar durante 10 segundos para que se adhiera bien a su piel. Si es necesario, puede colocar cinta adhesiva médica sobre el parche para mantenerlo en su lugar.
- Puede bañarse, ducharse y nadar mientras usa el parche.
- Evite usar el parche en el mismo lugar más de una vez por semana.
- Doble el parche usado por la mitad con los lados adhesivos juntos y arrójele en un contenedor de basura regular, lejos de niños o mascotas.
- Si tiene un desliz y usa tabaco, continúe usando el parche y trate de no fumar o chupar tabaco.
- Si comienza con parches de 21 mg, puede usar el parche durante uno o dos meses. Cuando esté listo, disminuya la dosis y continúe reduciéndola con el tiempo. Por lo general, disminuir su uso toma entre tres y cuatro meses, pero a veces puede tomar más tiempo. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus metas para disminuir su uso.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

- Puede causar ardor leve, picazón o enrojecimiento de la piel. Para reducir este problema, evite usar el parche en el mismo lugar en una semana.
- Si tiene irritación en la piel por más de cuatro días o si tiene ardor severo o urticaria, quítese el parche y deje de usarlo. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato.
- Puede tener problemas para dormir o sueños vívidos. Si es así, quítese el parche antes de acostarse a dormir.

PASTILLA DE NICOTINA DE 2 MG, 4 MG

Use cuando la necesite

¿QUÉ HACE ESTO?

La pastilla emite nicotina para ayudar a disminuir los síntomas de abstinencia y se puede usar durante el día para controlar los antojos fuertes.

¿CÓMO LA USO?

- Comience a usar la pastilla en la fecha en que va a dejar el tabaco.
- Deje que la pastilla se disuelva en su boca cerca de su mejilla y encía.
- Mueva la pastilla por diferentes partes de la boca. Una pastilla dura entre 20 y 30 minutos. Una mini pastilla dura entre 10 y 15 minutos.
- No mastique ni trague la pastilla.
- No coma ni beba algo ácido, como gaseosas o café, por 15 minutos antes o durante su uso.
- Use hasta 10 pastillas por día en la primera semana.
- Úsela durante el día cuando sea necesario.
- Cada semana, auto evalúese y disminuya gradualmente su uso de la pastilla durante tres a cuatro meses, o más tiempo si es necesario. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus metas para disminuir su uso.
- Si disminuye la dosis del parche de nicotina, es posible que desee aumentar el uso de pastillas de nicotina por un tiempo. Cuando esté listo, disminuya el uso de pastillas nuevamente.
- Puede usar chicle o dulces sin azúcar para reemplazar la pastilla.
- Si tiene un desliz y usa tabaco, continúe usando la pastilla y trate de no fumar o chupar tabaco.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

- Puede causar indigestión, malestar estomacal, náuseas, hipo, dolor de cabeza, irritación de la boca y dificultad para dormir. El uso correcto de las pastillas puede ayudar a evitar estos efectos secundarios.

¡Utilice estas herramientas para apoyo adicional!



Inscríbese en el programa de mensajes de texto de SmokefreeVET

Envíe un mensaje de texto con la palabra **VETesp** al **47848** o vaya a [Smokefree.gov/VETesp](https://www.smokefree.gov/VETesp).



Llame a la línea de ayuda para dejar el tabaco

Hable con un consejero de veteranos para dejar de usar tabaco. Llame al **1-855-QUIT-VET** (1-855-784-8838) de lunes a viernes.

El uso de medicamentos junto con la consejería conductual le da la mejor posibilidad para dejar de usar tabaco. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuál es el mejor medicamento para usted.

LA ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE VETERANOS
veterans.smokefree.gov/recursos-en-espanol

VA



U.S. Department
of Veterans Affairs

 **smokefreeVET**
en Español

1-855-Quit-Vet
TOBACCO QUITLINE